Малые кластеры серебра закрепленные на оксидах кремния и церия. Квантово-механическое исследование методами внедренного кластера и периодической супер ячейки

Шор А. М., Наслузов В. А., Шор Е. А., Лалетина С. С.

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск
Группа квантовой химии

Основная активность группы квантовой химии ИХХТ СО РАН:

1. Изучение свойств кластеров переходных металлов адсорбированных на оксидных подложках ковалентной и ионной природы, таких как SiO_2 , цеолиты, MgO , Al_2O_3 и CeO_2
2. Развитие гибридных QM/MM методов для изучения адсорбционных процессов на оксидной поверхности

Основные используемые программы:

1. ParaGauss – функционал плотности, атомарные орбитали гауссового типа. Совместная разработка с группой профессора Рёша, кафедра теоретической химии химического факультета Мюнхенского технического университета.
2. VASP - функционал плотности, периодические граничные условия, базис плоских волн

совЕРЕ – КМ/ММ гибридный методы внедрения КМ кластера в эластичное поляризуемое ММ ковалентное окружение

- **Область I** – КМ кластер + КМ/ММ граница
- **Область II** – ММ окружение
- **Релаксация** всех степеней свободы КМ кластера, КМ/ММ границы и ММ окружения
- **Явный учет** электростатического взаимодействия между КМ кластером и ММ окружением, с учетом периодичности оксидной системы
- **ММ силовое поле** основано на реалистичных, рассчитанных КМ методом, зарядах атомов
- **Использование** оболочечной модели (shell model) для описания поляризации кристаллического окружения (кислородные центры)
- **Самосогласованное** внедрение, т.е. отсутствие искажений ММ окружения в случае отсутствия дефекта в КМ кластере

covEPE метод

Описание границы между КМ кластером и ММ окружением

- **Моновалентный псевдоатом O^*** - на основе атома фтор
 - специально параметризованный эффективный потенциал Штутгартского типа
 - оптимизированный $(5s5p1d) \rightarrow [4s3p1d]$ электронный базис для семи валентных электронов
 - дополнительный заряд на ядре $-0.3e$
- **Безбазисный модельный псевдоатом Si^{PP*}**
 - параметризованный эффективный потенциал Штутгартского типа
 - заряд $+1.2e$
- Параметры O^* и Si^{PP*} оптимизированы, чтобы воспроизводить
 - Si-O, O-Si-O потенциальные кривые
 - электростатический потенциал КМ кластера
 - заряды на O, Si, O^* центрах

Граничная область SiO_2

Процедура совЕРЕ расчёта

- **Шаг 1:** ММ расчет кристаллической решетки, генерация ММ ЕРЕ окружения
⇒ регулярная структура

$$E_{tot}^{MM}(R_{lat}, \mu_{lat}) \underset{MIN}{\Rightarrow} R_{lat}^{reg}, \mu_{lat}^{reg}$$

- **Шаг 2:** КМ расчет невозмущенного кластера, внедренного в регулярное (замороженное) ММ окружение ⇒ референсная структура

$$E_{clean\ surface}^{QM}(\rho_{cl}, R_{cl}) \underset{MIN}{\Rightarrow} \rho_{cl}^{ref}, R_{cl}^{ref}$$

- **Шаг 3:** КМ/ЕРЕ расчет поверхности с дефектом или адсорбатом

$$E_{tot}^{EPE} = E_{cl}(\rho_{cl}, R_{cl}) + E_{int}^{eff}(\rho_{cl}^{eff}, R_{lat}, \mu_{lat}) + E_{lat}(R_{lat}, \mu_{lat}) \underset{MIN}{\Rightarrow} \rho_{cl}^{EPE}, R_{cl}^{EPE}, R_{lat}^{EPE}, \mu_{lat}^{EPE}$$

Процедура covEPE расчёта (шаг 3)

Расчет поверхностной реакции состоит из двух циклически повторяющихся шагов:

3а – Оптимизация КМ кластера в замороженных позициях атомов ММ окружения

3б – Оптимизация ММ окружения в замороженных позициях атомов КМ кластера

В обоих случаях замораживается также и зарядовая плотность

$$\rho_{cl}^{\text{eff}}(R_{cl}) = \rho_{cl}^{\text{QM}}(R_{cl}) - \rho_{cl}^{\text{QM}}(R_{cl}^{\text{ref}}) + \rho_{cl}^{\text{MM}}(R_{cl}^{\text{reg}}, \mu_{cl}^{\text{reg}})$$

Кластеры серебра размером от одного до нескольких десятков атомов характеризуются:

1. Высокой активностью в ряде важных каталитических процессов, таких как:
 1. Селективное восстановление NO углеводородами
 2. Эпоксидирование пропилена
 3. Дегидрирование спиртов
2. демонстрируют замечательные оптические и антимикробные свойства

Оксид кремния – характеризуется высокой термической стабильностью и относительной инертностью. Для закрепления кластеров металлов требуется активация поверхности SiO_2 путем создания точечных дефектов

Оксид церия демонстрирует окислительно-восстановительные свойства связанные прежде всего со способностью Ce^{4+} центров восстанавливаться до Ce^{3+} , что значительно повышает взаимодействие CeO_2 с кластерами переходных металлов

Цель работы

1. Установить предпочтительные центры адсорбции и способы координации кластеров Ag_n ($n = 1 - 7$) на поверхности SiO_2 и нанокластере CeO_2
2. Оценить энергетику процесса адсорбции, направления денуклеации/агломерации Ag кластеров (CeO_2), их взаимодействие с молекулярным кислородом (SiO_2)

Модели поверхности SiO_2 и активных центров NBO и E'

Двухслойная модель
поверхности SiO_2

NBO

E'

Активные центры поверхности SiO_2

1. NBO и E' – парамагнитные центры
2. Присутствуют на поверхности в условиях вакуума или в инертной атмосфере
3. Закрепление кластеров происходит путем осаждения в вакууме или реакций обмена в газовой или жидкой фазах

Кластеры Ag_3 , Ag_4 и Ag_7 на поверхности SiO_2

$Ag-O_N = 211 \text{ pm}$

$Ag-Si_E = 242 \text{ pm}$

Энергии адсорбции, кДж/моль

	Ag_3	Ag_4	Ag_7
NBO	381	253	330
E'	246	137	212

Свойства закрепленных кластеров Ag аналогичны свободным катионам Ag_n^+

	Свободный Ag_n^+	NBO	E'	M
Ag_3	3×269	3×268	3×272	0
Ag_4	4×276, 267	4×274, 270	4×273, 280	1
Ag_7	10×288, 5×280, 272	10×286, 5×281, 279	10×283, 5×282, 292	0

Молекулярная адсорбция O₂

Ag₃O₂/NBO

$E_b = 12$ кДж/моль
 $M = 2$
 $q(\text{Ag}_3) = 0,51$ e
 $\text{O}-\text{O} = 126$ пм

Ag_n⁺

18
2

$E_b = 22$ кДж/моль
 $M = 2$
 $q(\text{Ag}_3) = 0,10$ e
 $\text{O}-\text{O} = 128$ пм

Ag₃O₂/E'

Ag₄OO/NBO

$E_b = 97$ кДж/моль
 $M = 1$
 $q(\text{Ag}_4) = 0,79$ e
 $\text{O}-\text{O} = 134$ пм

46
1

$E_b = 59$ кДж/моль
 $M = 1$
 $q(\text{Ag}_4) = 0,33$ e
 $\text{O}-\text{O} = 132$ пм

Ag₄OO/E'

Ag₇O₂/NBO

$E_b = 19$ кДж/моль
 $M = 2$
 $q(\text{Ag}_7) = 0,54$ e
 $\text{O}-\text{O} = 126$ пм

O₂ = 124 пм

17
2

$E_b = 16$ кДж/моль
 $M = 2$
 $q(\text{Ag}_7) = 0,05$ e
 $\text{O}-\text{O} = 127$ пм

Ag₇O₂/E'

Диссоциативная адсорбция O₂

O²Ag₃O²/NBO

$E_b = -14$ кДж/моль
 $q(\text{Ag}_3) = 1,34$ e

Ag_n^+
-98

$E_b = 19$ кДж/моль
 $q(\text{Ag}_3) = 0,88$ e

O²Ag₃O²/E'

O²Ag₄O²/NBO

$E_b = 123$ кДж/моль
 $q(\text{Ag}_4) = 1,39$ e

-39

$E_b = 70$ кДж/моль
 $q(\text{Ag}_4) = 0,95$ e

O²Ag₄O²/E'

O²Ag₄O³/NBO

$E_b = 118$ кДж/моль
 $q(\text{Ag}_4) = 1,46$ e

-2

$E_b = 74$ кДж/моль
 $q(\text{Ag}_4) = 1,04$ e

O²Ag₄O³/E'

O²Ag₇O²/NBO

$E_b = 17$ кДж/моль
 $q(\text{Ag}_7) = 1,34$ e

-20

$E_b = 3$ кДж/моль
 $q(\text{Ag}_4) = 0,88$ e

O²Ag₇O²/E'

Диссоциация O₂

covEPE
ParaGauss

Барьер диссоциация O₂ определяется:

1. Активацией молекулярно адсорбированного кислорода – возможный эффект **58** кДж/моль
2. Деформацией кластера Ag – возможный эффект **132** кДж/моль

Выводы

1. Кластеры серебра адсорбированные на NBO и E' центрах воспроизводят электронные и структурные характеристики соответствующих катионных кластеров.
2. Соответственно и молекулярная адсорбция O₂ напоминает взаимодействие с Ag_n⁺.
3. Стабильности диссоциативных и молекулярных форм адсорбции O₂ близки друг к другу на кластерах одного размера.
4. Снижение барьеров диссоциации O₂ определяется степенью начальной активации и возможной деформацией кластера серебра вдоль реакционного пути. Второй фактор играет более важную роль.
5. Величины барьеров диссоциации O₂ указывают на низкую склонность субнаноразмерных кластеров Ag на поверхности SiO₂ к окислению

Модельная наночастица $\text{Ce}_{21}\text{O}_{42}$

1. Максимальный размер $\approx 10 \text{ \AA}$
2. Поверхность представлена **2x {100}** и **3x {111}** координированными атомами O
3. Грань {100} - 2 - 4 доступных атома O
4. Грань {111} - 3 доступных атома O
5. **Ce^*** - $\text{Ce}^{4+} \rightarrow \text{Ce}^{3+}$ трансформация в присутствии дефекта или адсорбата

Ag/CeO₂ комплекс

Система	$E_{\text{Ад}}$, кДж/моль	$r(\text{Ag-O})$, пм	$N(\text{Ce}^{3+})$	
{100}-1a	209	4 × 239	1	4O ^{2c}
{100}-1b	203	2 × 217; 2 × 280	1	4O ^{2c}
{100}-1c	193	2 × 218; 253	1	3O ^{2c}
{111}-1d	118	223; 2 × 247	1	O ^{2c} , 2O ^{3c}
{111}-1e	88	227; 2 × 246	1	O ^{2c} , 2O ^{3c}
{111}-1f	37	0	O ^{3c}	

1. Атом Ag окисляется до Ag⁺ (исключение on-top адсорбция - {111}-1f)
2. Образуется один Ce³⁺
3. $E_{\text{Ад}}(\text{Ag}/\{100\}) > E_{\text{Ад}}(\text{Ag}/\{111\})$
4. Величина $E_{\text{Ад}}$ коррелирует с числом и длиной Ag–O связей
5. Взаимодействие Ag–O^{2c} сильнее, чем Ag–O^{3c}

Ag₃/CeO₂ комплекс

Система	E_b , кДж/моль	$r(\text{Ag-O})$, пм	$r(\text{Ag-Ag})$, пм	$N(\text{Ce}^{3+})$	
{100}-3a	281	2×217	$2 \times 266; 271$	1	2O^{2c}
{111}-3b	239	212; 215	$2 \times 267; 270$	1	$\text{O}^{2c}, \text{O}^{3c}$
{100}-3c	238	$2 \times 222; 240$	3×269	1	4O^{2c}
{111}-3d	206	221; 2×226	3×270	1	$\text{O}^{2c}, 2\text{O}^{3c}$
{111}-3e	185	2×218	$2 \times 268; 274$	1	2O^{3c}

1. Кластер Ag₃ окисляется до катиона Ag₃⁺
2. Образуется один Ce³⁺
3. $E_{\text{Ад}}(\text{Ag}/\{100\}) \geq E_{\text{Ад}}(\text{Ag}/\{111\})$
4. Ориентация тримера перпендикулярно поверхности предпочтительнее
5. Взаимодействие Ag₃-O^{2c} сильнее, чем Ag₃-O^{3c}
6. $E_{\text{Ад}}(\{100\}-3a) > E_{\text{Ад}}(\{100\}-1a)$

Ag₄/CeO₂ комплекс

Система	E_b , кДж/моль	$r(\text{Ag-O})$, пм	$r(\text{Ag-Ag})$, пм	$N(\text{Ce}^{3+})$	
{100}-4a	301	2×212, 219, 248	3×273, 3×277	2	4O ^{2c}
{100}-4b	224	2×217; 2 ×219	5×272, 277	2	4O ^{2c}
{111}-4c	199	209; 2×211	3×274, 3×278	2	O ^{2c} , 2O ^{3c}
{100}-4d	189	2×214	4×271, 278	1	2O ^{2c}
{111}-4e	151	211; 214	4×271, 283	1	O ^{2c} , O ^{3c}

1. Кластер Ag₄ окисляется до катионов Ag₄⁺ и Ag₄²⁺
2. Образуется один или два Ce³⁺
3. $E_{\text{Ад}}(\text{Ag}/\{100\}) \gtrsim E_{\text{Ад}}(\text{Ag}/\{111\})$
4. Тетраэдр Ag₄ связан сильнее, чем ромб
5. Ag₄²⁺ связан сильнее, чем Ag₄⁺
6. Взаимодействие Ag₄-O^{2c} сильнее, чем Ag₄-O^{3c}
7. $E_{\text{Ад}}(\{100\}-4a) > E_{\text{Ад}}(\{100\}-1a)$

Денуклеация кластеров серебра

Реакция	E_{denuc}
$\{100\}\text{-}3\text{a} + 2\text{NP} \rightarrow 3 \times \{100\}\text{-}1\text{a}$	109
$\{100\}\text{-}4\text{a} + 3\text{NP} \rightarrow 4 \times \{100\}\text{-}1\text{a}$	107
$\{100\}\text{-}3\text{a} + 2\text{NP} \rightarrow 3 \times \{111\}\text{-}1\text{d}$	-173
$\{100\}\text{-}4\text{a} + 3\text{NP} \rightarrow 4 \times \{111\}\text{-}1\text{d}$	-269
$\{111\}\text{-}3\text{b} + 2\text{NP} \rightarrow 3 \times \{100\}\text{-}1\text{a}$	153
$\{111\}\text{-}4\text{c} + 3\text{NP} \rightarrow 4 \times \{100\}\text{-}1\text{a}$	213
$\{111\}\text{-}3\text{b} + 2\text{NP} \rightarrow 3 \times \{111\}\text{-}1\text{d}$	-129
$\{111\}\text{-}4\text{c} + 3\text{NP} \rightarrow 4 \times \{111\}\text{-}1\text{d}$	-163

1. Схема моделирует ситуацию на больших CeO_2 кластерах, где много $4\text{O}^{2\text{c}}$ граней
2. На грани $\{111\}$ предпочтительно существование кластеров серебра
3. На грани $\{100\}$ выгоднее существование отдельных атомов
4. Стабильность комплексов понижается в ряду $\text{Ag}/\text{NP}\{100\} > \text{Ag}_4/\text{NP}\{100\} > \text{Ag}_3/\text{NP}\{100\} > \text{Ag}_3/\text{NP}\{111\} > \text{Ag}_4/\text{NP}\{111\} > \text{Ag}/\text{NP}\{111\}$
5. Существование атомов Ag на грани $\{100\}$ наиболее выгодно, на грани $\{111\}$ наименее выгодно

Энергия адсорбции на один атом Ag, $E_{\text{Ад}}/N_{\text{Ag}}$

Выводы

- Адсорбция Ag частиц на нанокластере CeO_2 характеризуется сильными энергиями взаимодействия 90 – 310 кДж/моль
- Адсорбция сильнее на грани {100}, чем на грани {111}, 220-310 кДж/моль против 120-250 кДж/моль для наиболее прочно связанных изомеров
- На грани {100} происходит денуклеация Ag кластеров до атомарных частиц, а на грани {111} – агрегация атомов серебра в кластеры предпочтительнее

Сравнение основных адсорбционных характеристик кластеров Ag_3 и Ag_4 на поверхностях SiO_2 (NBO) и CeO_2 {100}

	SiO_2	CeO_2
1. Энергии адсорбции	253-381 кДж/моль	281-301 кДж/моль
2. Число Ag-O связей	1	2-4
3. Окислительное состояние	1+	1+,2+
4. Перенос заряда (электронов)	Локализуется в Ag-O	Перенос на подложку
5. Восстановление подложки	Нет восстановления	Частичное восстановление ($Ce^{4+} \rightarrow Ce^{3+}$)